

CONTINUITÉ

Exercice

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1 - 2 \sin x \sin 3x}{\cos x + \cos 3x}$; $x \neq \frac{\pi}{4}$ et

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

1) transformer $\sin x \sin 3x$ en somme et $\cos x + \cos 3x$ en produit

2) en déduire que f est continue en $a = \frac{\pi}{4}$

Exercice

Soit la fonction f telle que : $f(x) = \frac{(1-x)\sqrt{1+2x}-1}{x^2}$; $x \neq 0$ et $f(0) = -\frac{3}{2}$

1) calculer la limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1-x}{x^2}$

2) en déduire que f est continue en $a = 0$

Exercice

f est une fonction définie par : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}$; $x \neq 0$ et $f(0) = -2$

1) calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2) montrer que f continue en $a = 0$

Exercice

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \left(x - E\left(\frac{\pi}{2x}\right)\right) \sin x$

1) montrer que $(\forall a \in \mathbb{R}^*) \quad \lim_{x \rightarrow 0} x E\left(\frac{a}{x}\right) = a$

2) montrer que f admet un prolongement par continuité en 0 à déterminer

Exercice

a et b deux réels . soit la fonction f telle que :

$$f(x) = x ; x \leq 2 \quad \text{و} \quad f(x) = a - \frac{b}{x} ; 2 < x \leq 4 \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{1}{x} ; x > 4$$

1) étudier la continuité de f sur **على المجالات** $]-\infty, 2[$; $]2, 4[$ et $]4, +\infty[$

2) déterminer a et b pour que f soit continue sur \mathbb{R}

CONTINUITÉ

Exercice

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 + 3x^2} \cos(x)}{x^2}$; $x \neq 0$ et $f(0) = -1$

- 1) calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + mx^2} - 1}{x^2}$ (m un paramètre strictement positif)
- 2) prouver que f est continue en $a = 0$

Exercice

On considère la fonction f telle que : $f(x) = \frac{x E(x) + 2}{x + 1}$

- 1) a) déterminer $f(1)$ et montrer que f est continue à droite de $a = 1$
b) f est-elle continue en $a = 1$?
- 2) a) calculer $f(0)$ et montrer que f est continue à droite de $b = 0$
b) f est-elle continue en $b = 0$?

Exercice

- 1) calculer les limites $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2x} - 1 - x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + 3x} - 1 - x}{x^2}$
- 2) en déduire les limites $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2x} - \sqrt[3]{1 + 3x}}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2x} \times \sqrt[3]{1 + 3x} - 1 - 2x}{x^2}$

Exercice

- 1) montrer que l'équation $x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ admet une seule solution α et $1 < \alpha < 2$
- 2) en déduire la solution de $\sqrt[3]{x + \sqrt{x + 1}} = \sqrt{x}$

Exercice

Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[4]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{3-x}} \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(\pi(x^2 + x - 12))}{x - 3}$$
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5\sqrt[3]{x^2-1} - 2\sqrt{x^3-2}}{\sqrt[3]{x^2-1}\sqrt{x^3-2} - 10} \quad , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[6]{32 - \sqrt{2-x^2}} \sqrt[3]{1 + \cos x}}{\sqrt[3]{2}\sqrt{2-x^2} - \sqrt{2}\sqrt[3]{1 + \cos x}}$$
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \arctan\left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1 - \frac{1}{x}\right) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sqrt{1+x} - 1)}{x^2}$$
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan 2x - \arctan \sqrt{x^2 + 1} \right) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}\right)$$

CONTINUITÉ

Exercice

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 2x - \cos x$

- 1) étudier le sens des variations de f
- 2) montrer que $f(x) = \frac{\pi}{6}$ admet une unique solution α dans $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$
- 3) lequel des intervalles $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ ou $\left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$ contient α
- 4) déterminer un encadrement de α d'amplitude $\frac{\pi}{8}$

Exercice

1) soit la fonction f définie sur $I =]-1, 1[$ par : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

- a) calculer les limites de f et étudier les variations de f
 - b) montrer que f est une bijection de I vers J à déterminer
 - c) exprimer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J
- 2) soit F la fonction définie sur I par : $F(x) = \arctan(f(x))$
- a) dresser le tableau de variation de F
 - b) montrer que F est bijective de I vers K que l'on déterminera
 - c) exprimer $F^{-1}(x)$ pour tout x de K
- 3) en déduire que $(\forall x \in \mathbb{R}) \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Exercice

On considère la fonction f définie sur $D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par : $f(x) = \sin^2 x$

- 1) Montrer que f réalise une bijection de D vers I à déterminer
- 2) prouver que $(\forall x \in I) f^{-1}(x) = \arctan \sqrt{\frac{x}{1-x}}$
- 3) en déduire que $(\forall x \in \mathbb{R}^+) \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$