


2

- Cycle chromosomique de *Derbesia*:

haplophase ———

diplophase = = =



0.75 pt

.....(0.5 pt)

- Cycle de type: haplodiplophasique.....(0.25 pt)

3

- F₁ est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée.....(0.25 pt)
- Pour la forme de la corolle, la descendance F₁ possède le phénotype de l'un des parents, donc l'allèle responsable de la forme normale est dominant noté **N** et l'allèle responsable la forme anormale est récessif noté **n**..... (0.25 pt)
- Pour la couleur de la corolle, la descendance F₁ possède un phénotype intermédiaire entre les phénotypes des parents, donc les allèles responsables de la couleur de la corolle sont codominants: l'allèle responsable de la couleur blanche est noté **B** et l'allèle responsable de la couleur rouge est noté **R**.....(0.25 pt)

0.75 pt

4

Interprétation chromosomique du premier croisement:

Parents	P ₁	×	P ₂
Phénotypes	[N, R]		[n, B]
Génotypes: (0.25 pt)	$\frac{N}{N} \frac{R}{R}$		$\frac{n}{n} \frac{B}{B}$
Gamètes : (0.25 pt)	$\frac{N}{100\%} \frac{R}{100\%}$	↙ ↘	$\frac{n}{100\%} \frac{B}{100\%}$
Fécondation			$\frac{N}{n} \frac{R}{B}$
F ₁ (0.25 pt)			[N, RB] 100%

3.5 pts

Interprétation chromosomique du deuxième croisement :

F ₁ × F ₁ :	[N, RB]		[N, RB]
Génotypes (0.25 pt)	$\frac{N}{n} \frac{R}{B}$		$\frac{N}{n} \frac{R}{B}$
Gamètes (0.5 pt)	$\frac{NR}{25\%} ; \frac{NB}{25\%} ; \frac{nR}{25\%} ; \frac{nB}{25\%}$		$\frac{NR}{25\%} ; \frac{NB}{25\%} ; \frac{nR}{25\%} ; \frac{nB}{25\%}$

Echiquier de croisement (1 pt)

F_1	$\frac{1}{4}$ $\frac{N}{R}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{N}{B}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{n}{R}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{n}{B}$
$\frac{N}{R}$	$\frac{1}{16}$ $\frac{N}{R}$ [N,R]	$\frac{1}{16}$ $\frac{N}{B}$ [N,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,R]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,RB]
$\frac{N}{B}$	$\frac{1}{16}$ $\frac{N}{R}$ [N,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{N}{B}$ [N,B]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,B]
$\frac{n}{R}$	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,R]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,R]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,RB]
$\frac{n}{B}$	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,B]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{R}$ [n,RB]	$\frac{1}{16}$ $\frac{n}{B}$ [n,B]

Résultats théoriques des individus de F_2 : [N, RB] 6/16 ; [N, B] 3/16 ; [N, R] 3/16 ; [n, RB] 2/16 ; [n, B] 1/16 ; [n, R] 1/16.....(0.25 pt)

Résultats expérimentaux des individus de F_2(0.5 pt)

[N, RB]= 370/997=0.37≈6/16

[N, B]= 187/997=0.19≈3/16

[N, R]= 189/997=0.19≈3/16

[n, RB]= 126/997=0.13≈2/16

[n, B]=62/997=0.06≈1/16

[n, R]=63/997=0.06≈1/16

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, la proposition des apprenants est correcte.....(0.25 pt)

5

Troisième croisement:

- La fleur à corolle de forme anormale et de couleur rouge est double homozygote pour les deux gènes, donc produit un seul type de gamète ($\frac{n}{R}$ 100%).....(0.25 pt)

- La fleur, hétérozygote pour le gène responsable de la forme de la corolle, produit deux types de gamètes ($\frac{N}{B}$ 50% et $\frac{n}{B}$ 50%).....(0.25 pt)

Echiquier de croisement :

F_1	$\frac{N}{B}$	$\frac{n}{B}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{n}{R}$	$\frac{N}{B}$ $\frac{n}{R}$ [N, RB] 1/2	$\frac{n}{B}$ $\frac{n}{R}$ [n, RB] 1/2

La descendance: [N, RB] 50% ; [n, RB] 50%(0.25 pt)

0.75 pt

Exercice 2 (3 points)

Question

Eléments de réponse

Barème

1

- Les parents I_1 et I_2 sont sains et ont un enfant malade (II_3). L'allèle responsable de la maladie est récessif.

0.5 pt

2

I_2 : $X_N X_m$ femme saine et a un garçon malade.....(0.25 pt)
 II_1 : $X_N X_N$ ou $X_N X_m$ (porteuse de la maladie), sa mère est hétérozygote $X_N X_m$ et son père est sain $X_N Y$(0.5 pt)

0.75 pt

3	Échiquier : (0.5 pt) Donc la probabilité pour qu'un enfant à naitre des parents I_1 , I_2 soit malade est $1/4$(0.25 pt)	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Mère I_2</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Père I_1</td> <td style="text-align: center;">X_N1/2</td> <td style="text-align: center;">X_m1/2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X_N 1/2</td> <td style="text-align: center;">X_NX_N [N]1/4</td> <td style="text-align: center;">X_NX_m [N]1/4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Y1/2</td> <td style="text-align: center;">X_N Y [N]1/4</td> <td style="text-align: center;">X_m Y [m]1/4</td> <td></td> </tr> </table>		Mère I_2			Père I_1	X _N 1/2	X _m 1/2		X _N 1/2	X _N X _N [N]1/4	X _N X _m [N]1/4		Y1/2	X _N Y [N]1/4	X _m Y [m]1/4		0.75 pt
	Mère I_2																		
Père I_1	X _N 1/2	X _m 1/2																	
X _N 1/2	X _N X _N [N]1/4	X _N X _m [N]1/4																	
Y1/2	X _N Y [N]1/4	X _m Y [m]1/4																	
4	- La présence de deux fragments de taille respective égale à 1,8 kb et 1,3 kb chez l'enfant à naitre II_4 montre l'existence des deux allèles du gène.....(0.5 pt) - le gène est lié au chromosome sexuel X, donc l'enfant à naitre sera une fille porteuse de la maladie, son génotype est $X_N X_m$ mais son phénotype est normal.....(0.5 pt)		1 pt																

Exercice 3 (5 points)		
Question	Eléments de réponse	Barème
1	a- Dans la zone des oyats, le nombre d'escargots avec coquilles à bandes sombres est presque 3 fois le nombre d'escargots avec coquilles à bandes claires..(0.25pt) - Dans la zone de la plage, le nombre d'escargots avec coquilles à bandes claires est 9 fois le nombre d'escargots avec coquilles à bandes sombres.....(0.25pt)	0.5 pt
	b- L'aménagement de la dune en plage a entraîné l'augmentation du nombre d'escargots avec coquilles à bandes claires et la diminution du nombre d'escargots avec coquilles à bandes sombres.	0.5 pt
2	- Dans la zone des oyats, les escargots dont la coquille est à bandes claires sont les plus consommés car ils sont facilement repérables par les grives. (les escargots dont la coquille est à bandes sombres ont l'avantage de survie).....(0.5 pt) - Dans la zone de la plage (où il y a le panicaut de sable, le chou maritime et le pourpier) les escargots dont la coquille est à bandes sombres sont les plus consommés car ils sont facilement repérables par les grives. (les escargots dont la coquille est à bandes claires ont l'avantage de survie)(0.5 pt)	1 pt
3	fig a : Dans la zone des oyats, la fréquence de l'allèle B diminue progressivement jusqu'à devenir minoritaire à la dixième génération (environ 0.1), alors que dans la zone de la plage la fréquence de l'allèle B augmente jusqu'à devenir majoritaire à la dixième génération (environ 0.94)..... (0.5 pt) fig b : Dans la zone des oyats, la fréquence de l'allèle N augmente progressivement jusqu'à devenir majoritaire à la dixième génération (environ 0.92), alors que dans la zone de la plage la fréquence de l'allèle N diminue jusqu'à devenir minoritaire à la dixième génération (environ 0.1)..... (0.5 pt)	1 pt
4	- Dans la zone des oyats: - L'allèle B est minoritaire et l'allèle N est majoritaire dans la population d'escargots..... (0.25 pt) - Cause : les grives consomment les individus dont la coquille est à bandes claires, facilement repérables..... (0.25 pt) - Facteur de variation : sélection favorable pour les individus ayant des coquilles à bandes sombres qui arrivent à se camoufler et par conséquent survivent et se reproduisent entre eux(0.25 pt) - Résultat : propagation préférentielle de l'allèle N à travers les générations ce qui	2 pts

الصفحة	5	RR36F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (المسالك الدولية) - الدورة الاستدراكية 2019 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ) - خيار فرنسية
5			

	<p>aboutit à l'augmentation de la fréquence du phénotype [N]..... (0.25 pt)</p> <p>-Dans la zone de la plage:</p> <p>- L'allèle B est majoritaire et l'allèle N est minoritaire dans la population d'escargots(0.25 pt)</p> <p>- Cause : les grives consomment les individus dont la coquille est à bandes sombres facilement repérables..... (0.25 pt)</p> <p>- Facteur de variation : sélection favorable pour les individus ayant des coquilles à bandes claires qui arrivent à se camoufler et par conséquent survivent et se reproduisent entre eux(0.25 pt)</p> <p>- Résultat : propagation préférentielle de l'allèle B à travers les générations ce qui aboutit à l'augmentation du phénotype [B]..... (0.25 pt)</p>	
--	---	--