

Exercice 1 : Réponds par vrai ou faux :

- ♣ La chaleur et la température sont deux grandeurs distinctes
- ♣ La température se mesure en degrés Celsius.....
- ♣ Lorsqu'on comprime un gaz, sa masse ne change pas
- ♣ L'unité internationale de la pression est le Pascale.....
- ♣ La pression atmosphérique se mesure avec le manomètre.....
- ♣ L'air est compressible car son volume ne change pas.
- ♣ La température diminue si le thermomètre reçoit la chaleur
- ♣ La température d'un corps diminue s'il cède la chaleur.....
- ♣ La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide.....
- ♣ La sublimation est le passage de l'état solide à l'état gazeux.....
- ♣ Pour mesurer une température, on utilise un manomètre.....
- ♣ La température de fusion de l'eau est 100°C dans les conditions de l'expérience.....


Exercice 2 : Convertir :

1bar =.....Pa	1atm=..... bar
1hPa=.....Pa	2,5bar =Pa
760mm de mercure(Hg) =.....hPa	800mm de mercure=.....hPa
5000Kg/m ³ =.....g/cm ³	1Kg/L=.....g/cm ³

Exercice 3 : On utilise un thermomètre à mercure pour repérer les températures de trois corps A ,B et C .Les résultats obtenus sont les suivants :

1. Compléter le tableau suivant :

Corps	A	B	C
Température en °C
Température en °F
Température en °K



Corps A

Corps B

Corps C

2. Classer ces corps du plus chaud au plus froid ?

.....
.....

Exercice 4 : Mesure d'une grandeur physique liée aux gaz

1. Quel est le nom de l'appareil représenté sur l'image ci-contre ?

2. Quelle grandeur physique permet-il de mesurer?

3. Quelle est l'unité du système international associée à cette grandeur physique ?

4. Citez une autre unité souvent utilisée pour cette même grandeur.



Exercice 5:

Un règle en Aluminium a pour volume 700mL. Quelle est sa masse ? (Avec $\rho=2,7\text{g/cm}^3$ pour l'aluminium).

Exercice 6:

Un objet en Aluminium a pour masse 700g. Quel son volume ? (Avec $\rho=2,7\text{g/cm}^3$ pour l'aluminium).

Exercice 7:

On enferme de l'air dans une seringue avec un doigt puis on considère les deux situations suivantes :

A. on pousse le piston.


B. on tire le piston .

1) Donner la différence entre :

✓ La masse du gaz dans la situation A et la situation B

✓ Le volume du gaz dans la situation A et la situation B

✓ La pression du gaz dans la situation A et la situation B.



Exercice 8:

La pression de l'air enfermé dans une seringue est de 2000hPa.

On déplace le piston et on mesure alors 1010 hPa.

1. Comment le volume d'air a-t-il varié à l'intérieur de la seringue ? justifiez votre réponse.

2. L'air-a-t-il été comprimé ou détendu ?

3. Entourez la bonne réponse :

Le piston de la seringue **a été poussé / a été tiré / est resté immobile.**

4. Exprimez ses deux pressions en bar et en mmHg.

Exercice 9:

La pression de l'air enfermé dans une seringue est mesurée avec un manomètre. Le manomètre indique 1000hPa.

1. Lorsque l'on déplace le piston, le manomètre indique 1100mbar .le piston a-t-il été poussé ou tiré ?

2. Même question si le manomètre indique 950 mbar ?

3.