

## Planche n° 26. Polynômes

\* très facile \*\* facile \*\*\* difficulté moyenne \*\*\*\* difficile  
I : Incontournable T : pour travailler et mémoriser le cours

### Exercice n° 1 (\*\*\*)

Calculer  $a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$  pour  $n \geq 2$ .

### Exercice n° 2 (\*\*\*)

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , on pose  $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ . On note  $Q$  le polynôme  $Q = 1 + 2X + \dots + nX^{n-1}$ .

Calculer  $\prod_{k=0}^{n-1} Q(\omega_k)$ .

### Exercice n° 3 (\*\*\*\*I) (Calcul de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ )

1) Soient  $p$  un entier naturel et  $a$  un réel. Donner le développement de  $(\cos a + i \sin a)^{2p+1}$  puis en choisissant astucieusement  $a$ , déterminer  $\sum_{k=1}^p \cotan^2 \frac{k\pi}{2p+1}$ . En déduire alors  $\sum_{k=1}^p \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2p+1}}$ .

2) Pour  $n$  entier naturel non nul, on pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ . Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge (pour majorer  $u_n$ , on remarquera que  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ ).

3) Montrer que pour tout réel  $x$  de  $]0, \frac{\pi}{2}[$ , on a  $\cotan x < \frac{1}{x} < \frac{1}{\sin x}$ .

4) En déduire un encadrement de  $u_n$  puis la limite de  $(u_n)$ .

### Exercice n° 4 (\*\*IT)

Déterminer le PGCD de  $X^6 - 7X^4 + 8X^3 - 7X + 7$  et  $3X^5 - 7X^3 + 3X^2 - 7$ .

### Exercice n° 5 (\*\*T)

Pour quelles valeurs de l'entier naturel  $n$  le polynôme  $(X+1)^n - X^n - 1$  est-il divisible par  $X^2 + X + 1$ ?

### Exercice n° 6 (\*\*\*)

Soit  $P$  un polynôme à coefficients réels tel que  $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$ . Montrer qu'il existe deux polynômes  $R$  et  $S$  à coefficients réels tels que  $P = R^2 + S^2$ .

### Exercice n° 7 (\*\*)

Soit  $P$  un polynôme différent de  $X$ . Montrer que  $P(X) - X$  divise  $P(P(X)) - X$ .

### Exercice n° 8 (\*\*\*)

Soit  $P$  un polynôme à coefficients entiers relatifs de degré supérieur ou égal à 1. Soit  $n$  un entier relatif et  $m = P(n)$ .

1) Montrer que  $\forall k \in \mathbb{Z}, P(n + km)$  est un entier divisible par  $m$ .

2) Montrer qu'il n'existe pas de polynômes non constants à coefficients entiers tels que  $P(n)$  soit premier pour tout entier  $n$ .

**Exercice n° 9 (\*\*\*)** (Polynômes  $P$  vérifiant  $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ )

Soit  $E$  la partie de  $\mathbb{C}[X]$  formée des polynômes  $P$  vérifiant  $\forall a \in \mathbb{Z}, P(a) \in \mathbb{Z}$ .

1) On pose  $P_0 = 1$  et pour  $n$  entier naturel non nul,  $P_n = \frac{1}{n!} \prod_{k=1}^n (X+k)$  (on peut définir la notation  $P_n = C_{X+n}^n$ ). Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, P_n \in E$ .

2) Montrer que toute combinaison linéaire à coefficients entiers relatifs des  $P_n$  est encore un élément de  $E$ .

3) Montrer que  $E$  est l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers relatifs des  $P_n$ .

**Exercice n° 10 (\*\*\*)**

Division euclidienne de  $P = \sin aX^n - \sin(na)X + \sin((n-1)a)$  par  $Q = X^2 - 2X \cos a + 1$ ,  $a$  réel donné,  $n \geq 2$ .

**Exercice n° 11 (\*\*\*\*I)** (Théorème de LUCAS.)

Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  de degré supérieur ou égal à 1. Montrer que pour toute racine  $z$  de  $P'$ , il existe des réels positifs  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , de somme égale à 1 tels que  $z = \sum_{k=1}^n \lambda_k z_k$  où  $z_1, \dots, z_n$  sont les  $n$  racines distinctes ou confondues de  $P$  dans  $\mathbb{C}$  (on dit que les racines de  $P'$  sont des barycentres à coefficients positifs des racines de  $P$  ou encore que les racines de  $P'$  sont dans l'enveloppe convexe des racines de  $P$ ). Indication : calculer  $\frac{P'}{P}$ .

**Exercice n° 12 (\*\*\*)**

Décomposer en produit de facteurs irréductibles dans  $\mathbb{R}[X]$  le polynôme  $X^6 - 2X^3 \cos a + 1$  où  $a$  est un réel donné dans  $[0, \pi]$ .

**Exercice n° 13 (\*\*\*T)**

Trouver un polynôme de degré 5 tel que  $P(X) + 10$  soit divisible par  $(X+2)^3$  et  $P(X) - 10$  soit divisible par  $(X-2)^3$ .

**Exercice n° 14 (\*\*\*I)**

Trouver les polynômes  $P$  de  $\mathbb{R}[X]$  vérifiant  $P(X^2) = P(X)P(X+1)$  (penser aux racines de  $P$ ).

**Exercice n° 15 (\*\*T)**

Déterminer  $a \in \mathbb{C}$  tel que  $P = X^5 - 209X + a$  admette deux zéros dont le produit vaut 1.

**Exercice n° 16 (\*\*\*T)**

Soit  $(a_k)_{1 \leq k \leq 5}$  la famille des racines de  $P = X^5 + 2X^4 - X - 1$ . Calculer  $\sum_{k=1}^5 \frac{a_k + 2}{a_k - 1}$ .

**Exercice n° 17 (\*\*)**

Résoudre dans  $\mathbb{C}^3$  le système : 
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \\ xyz = -4 \end{cases}$$

**Exercice n° 18 (\*\*T)**

Trouver tous les polynômes  $P$  vérifiant  $P(2X) = P'(X)P''(X)$ .

**Exercice n° 19 (\*\*)**

1) Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  un polynôme non nul de degré  $n \in \mathbb{N}$ , dont les coefficients  $a_0, \dots, a_n$ , sont des entiers relatifs.

Soient  $p$  un entier relatif non nul et  $q$  un entier naturel non nul tels que  $\text{PGCD}(p, q) = 1$  puis  $r = \frac{p}{q}$ .

Montrer que si  $P(r) = 0$ , alors  $p$  divise  $a_0$  et  $q$  divise  $a_n$ .

2) Factoriser dans  $\mathbb{C}[X]$  le polynôme  $12X^4 + X^3 + 15X^2 - 20X + 4$ .

**Exercice n° 20 (\*\*\*)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $(X-1)^{2n} - X^{2n} + 2X - 1$  est divisible par  $2X^3 - 3X^2 + X$  puis déterminer le quotient.

**Exercice n° 21 (\*\*I)**

1) Soit  $n$  un entier naturel non nul. Déterminer deux polynômes  $U$  et  $V$  tels que  $UX^n + V(1-X)^n = 1$  et  $\deg(U) < n$  et  $\deg(V) < n$ .

2) Plus généralement, si  $n$  et  $m$  sont deux entiers naturels non nuls, déterminer deux polynômes  $U$  et  $V$  vérifiant  $UX^n + V(1-X)^m = 1$  et  $\deg(U) < m$  et  $\deg(V) < n$ .

**Exercice n° 22 (\*\*I)**

Soit  $P$  un polynôme réel de degré supérieur ou égal à 2.

1) a) Montrer que si  $P$  n'a que des racines simples et réelles, il en est de même de  $P'$ .

b) Le résultat persiste-t-il si on suppose simplement que les racines de  $P$  sont simples mais pas nécessairement réelles?

2) Montrer que si  $P$  est scindé sur  $\mathbb{R}$ , il en est de même de  $P'$ .

**Exercice n° 23 (\*\*\*)**

Former une équation du sixième degré dont les racines sont les  $\sin \frac{k\pi}{7}$  où  $k \in \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$  puis montrer que ces six nombres sont irrationnels.

**Exercice n° 24 (\*\*\*)**

Résoudre dans  $\mathbb{C}^3$  le système 
$$\begin{cases} y^2 + yz + z^2 = 7 \\ z^2 + zx + x^2 = 13 \\ x^2 + xy + y^2 = 3 \end{cases} .$$

**Exercice n° 25 (\*\*\*)**

Déterminer  $\lambda$  et  $\mu$  complexes tels que les zéros de  $z^4 - 4z^3 - 36z^2 + \lambda z + \mu$  soient en progression arithmétique.

**Exercice n° 26 (\*\*\*)**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^4 - 21z + 8 = 0$  sachant qu'il existe deux des solutions sont inverses l'une de l'autre.

**Exercice n° 27 (\*\*\*)**

Soient  $x_1, x_2, x_3$  les zéros de  $X^3 + 2X - 1$ . Calculer  $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ .

**Exercice n° 28 (\*\*\*)**

Soit  $P$  un polynôme à coefficients complexes de degré 4.

Montrer que les images dans le plan complexe des racines de  $P$  forment un parallélogramme si et seulement si  $P'$  et  $P^{(3)}$  ont une racine commune

**Exercice n° 29 (\*\*I)**

Soit  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à 2. Pour  $k \in \mathbb{Z}$ , on pose  $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ .

1) Calculer  $\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{2}{2 - \omega_k}\right)$ .

2) Montrer que, pour tout réel  $\alpha$ ,  $\prod_{k=0}^{n-1} (\omega_k^2 - 2\omega_k \cos \alpha + 1) = 2(1 - \cos(n\alpha))$  (questions indépendantes.)